

D-Cura

2.400 I.E./ml, druppels voor oraal gebruik, oplossing

Cholecalciferol

**Druppelflacon met 10 ml oplossing
(per druppel 66,7 I.E.)**



Doseringsadvies

Uitsluitend op recept verkrijgbaar (UR). Wordt volledig vergoed.

Indicatie	Vitamine D3 I.E./dag	Dagelijkse dosis: aantal druppels/dag	Commentaar
Behandeling van vitamine D deficiëntie of insufficiëntie	800 - 4.000 I.E.*	12 - 60 druppels per dag	Deficiëntie: serum 25-hydroxycalciferol (25OHD) < 25 nmol/l Insufficiëntie: 25OHD 25 - 50 nmol/l**
Profylaxe van vitamine D deficiëntie bij malabsorptie	800 - 2.000 I.E.	12 - 30 druppels per dag	Kinderen en zuigelingen: 667 I.E. per dag (10 druppels). Dosering > 1.330 I.E. per dag alleen voor patiënten met speciale behoeften.
Profylaxe van rachitis bij te vroeg geboren kinderen, zuigelingen en kinderen	< 1 jaar: 400 I.E. > 1 jaar: 400 - 600 I.E. te vroeg geboren: 200 - 400 I.E.	< 1 jaar: 6 druppels per dag > 1 jaar: 6 - 9 druppels per dag te vroeg geboren: 3 - 6 druppels per dag	
Profylaxe van osteomalacie veroorzaakt door vitamine D deficiëntie	Onderhoudsdosering: 1.000 - 2.000 I.E	Onderhoudsdosering: 15 - 30 druppels per dag	Een adequate calcium supplementie wordt aanbevolen.
Ondersteunende behandeling bij osteoporose, in combinatie met calcium en, indien wenselijk, met een specifieke anti-osteoporose middel	800 - 1.000 I.E.	12 tot 15 druppels per dag	

* Bij grote hoeveelheden druppels kunnen patiënten de totale dagdosering verdelen over meerdere innames per dag.

** Patiënt zijn 25OHD serumwaarde, leeftijd, symptomen, huidskleur evenals aanvullende innames van vitamine D dienen in overweging te worden genomen. De dosering dient individueel te worden vastgesteld door de behandelend arts.